

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

### ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60436  
Τηλ.: 2310476662, Fax: 2310476663  
Email: pkrfpet1@otenet.gr



Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

**No 9 / 27 Μαρτίου 2015**

## ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

### ΜΗΛΙΑ

#### **A. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ (*Venturia inaequalis* Cooke Wint.)**

- Στις δειγματοληψίες φύλλων που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκαν ώριμα ασκοσπόρια. Συνιστάται **άμεση επέμβαση** με εγκεκριμένα σκευάσματα ή στο στάδιο της πράσινης κορυφής (C έως C<sub>3</sub>, εικόνα 1).
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Boscalid, Calcium copper sulfate, Captan, Copper hydroxide, Copper oxide, Copper oxychloride, Cyproconazole, Cyprodinil, Difenoconazole, Dithianon, Dodine, Fludioxonil, Folpet, Kresoxim-methyl, Laminarin, Mancozeb, Maneb, Metiram, Myclobutanil, Propineb, Pyraclostrobin, Pyrimethanil, Tebuconazole, Thiram, Triadimenol, Trifloxystrobin, Ziram.

#### **B. ΣΑΝ ΖΟΖΕ, Ψόρα του San José (*Quadraspidiotus perniciosus*, Homoptera: Diaspididae)**


- Σε οπωρώνες με προσβολές από το κοκκοειδές συνιστάται επέμβαση με παραφινέλαια εναντίον της διαχειμάζουσας μορφής, στη διόγκωση των οφθαλμών έως το στάδιο της πράσινης κορυφής (B έως C<sub>3</sub>, εικόνα 1).
- Με την εφαρμογή αυτή επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και μία σημαντική μείωση των χειμερινών αυγών του κόκκινου τετράνυχου, καθώς και καταπολέμηση των διαχειμαζόντων μορφών του Ανθονόμου της μηλιάς (*Anthonomus pomorum* L., Coleoptera: Curculionidae) και της Βαμβακάδας της μηλιάς (*Eriosoma lanigerum* Hausmann, Homoptera: Aphididae).



## ΑΧΛΑΔΙΑ

### ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ (*Venturia pirina* Aderhold)

- Στις δειγματοληψίες φύλλων που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκαν ώριμα ασκοσπόρια. Συνιστάται **άμεση επέμβαση** με εγκεκριμένα σκευάσματα ή στο στάδιο της πράσινης κορυφής (C<sub>3</sub> έως D, εικόνα 2).
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Boscalid, Captan, Copper hydroxide, Copper oxide, Copper oxychloride, Cyprodinil, Difenoconazole, Dithianon, Dodine, Fludioxonil, Mancozeb, Metiram, Myclobutanil, Pyraclostrobin, Pyrimethanil, Thiram, Tribasic copper sulfate, Trifloxystrobin, Ziram.
- Εάν επιλεγεί Copper hydroxide ή laminarin επιτυγχάνεται και ταυτόχρονη κάλυψη για το βακτηριακό κάψιμο (*Erwinia amylovora* Burrill Winslow et al.)



**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Νικολάου Σταυρούλα